

登録番号：第20863号
 名称：ランネート45DF

2017年5月31日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	メソミル を含む 農薬の総 使用回数					
かぼちゃ	ワタアブラムシ	1000倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内					
いちご	イチゴメセンチュウ イチゴセンチュウ			1000倍	100~300 L/10a		育苗期 定植後 生育初期	4回以内	散布	4回以内		
	イチゴネバセンチュウ コガネムシ類幼虫	1~2L/m ² 2~3L/m ²	移植活着後 (育苗期)			4回以内	灌注				4回以内	
ピーマン (露地栽培)	タバコガ ハスモンヨトウ	1000~2000倍	100~300 L/10a	収穫開始14 日前まで	3回以内	散布	3回以内					
キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 タマナギンウワバ			1000~2000倍				100~300 L/10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	3回以内
	はくさい								アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類			
こまつな	アブラムシ類	1000倍	100~300 L/10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	3回以内					
かぶ	アオムシ アブラムシ類			1000倍	100~300 L/10a		収穫7日前 まで	2回以内	2回以内			
レタス	ヨトウムシ アブラムシ類	1000~2000倍	100~300 L/10a	収穫21日前 まで	2回以内	散布	2回以内 (植付時の 土壌混和は 1回以内)					
	オオタバコガ ナメクジ類	1000倍					2回以内	2回以内				
サラダ菜	ヨトウムシ アブラムシ類	1000~2000倍	100~300 L/10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内					
カリフラワー	オオタバコガ	1000倍						2回以内	2回以内			
ブロッコリー	ヨトウムシ アブラムシ類	1000~2000倍	100~300 L/10a	収穫7日前 まで	4回以内	散布	4回以内					
ほうれんそう	ヨトウムシ シキイロアザミ アブラムシ類							1000~2000倍	4回以内	4回以内		
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000倍	100~300 L/10a	収穫7日前 まで	4回以内	散布	4回以内					
たまねぎ	ネギアザミウマ	1000~2000倍						4回以内	4回以内			
しょうが	ハスモンヨトウ	1000~2000倍						4回以内	4回以内			

(つづき)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	メソミル を含む 農薬の総 使用回数		
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ	1000~2000倍	100~300 L/10a	収穫 21 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内 (は種時の 土壌混和は 1 回以内)		
ばれいしょ	ジャガイモガ ナストビハムシ シヨウホクテノウ アブラムシ類	1000 倍		収穫 7 日前 まで	5 回以内		5 回以内		
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	1000~2000倍		収穫 14 日 前まで	4 回以内		4 回以内		
だいず	ハスモンヨトウ シイロゾクダラメウガ マメシンクイガ			収穫 7 日前 まで	3 回以内		3 回以内		
えだまめ	カメムシ類 ツメクサガ			5 回以内	5 回以内		5 回以内		
てんさい	ヨトウムシ トビハムシ	1000 倍		収穫前日 まで	2 回以内		2 回以内 (は種前の 土壌混和は 1 回以内)		
にんじん	ヨトウムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類			収穫 30 日前 まで	1 回		1 回		
パセリ	アブラムシ類			200~400 L/10a	摘採 21 日前 まで		2 回以内	2 回以内	
茶	ハスモンヨトウ チャトゲコナジラミ	1000 倍			200~400 L/10a		摘採 21 日前 まで	2 回以内	2 回以内
	コカクモンハマキ チャハマキ チャノホソガ ミドリヒメヨコバイ	1000~1500倍							
	チャノキイアザミウマ ツマグロアオカミ	1000~2000倍							
食用ゆり	カバネコバエ類	500 倍	—	植付前		1 回			
セルリー	ヨトウムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類	1000 倍	100~300 L/10a	収穫 30 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内		
アスパラガス	ネギアザミウマ		1~3L/m ²	収穫前日 まで	1 回		1 回	2 回以内 (散布は 1 回以内、 灌注は 1 回 以内)	
	ナメクジ類		1L/m ²	収穫 3 日前 まで		2 回以内		2 回以内	2 回以内
にら	ネギアザミウマ			100~300 L/10a	収穫 21 日前 まで		2 回以内		
らっきょう	ネダニ類		100~300 L/10a		収穫 7 日前 まで	2 回以内		2 回以内	
ごぼう	アブラムシ類			散布					

(つづき)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メソミルを含む農薬の総使用回数
チンゲンサイ	アブラムシ類	1000 倍	100~300 L/10a	収穫 14 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
たばこ	タバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000~2000 倍	25~180 L/10a	収穫 10 日前 まで			

[ランネット 45DF の製品ページへ戻る](#)