

適用害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	銅を含む 農薬の 総使用 回数
ばれいしょ	そうか病	100 倍	—	植付前	—	種い も瞬 間浸 漬	—
	軟腐病	1000 倍	100～ 300L/10a	—			
トマト ミニトマト	疫病						
だいこん	白さび病						
こんにやく	葉枯病						
ほうれんそう	べと病 白斑病						
ブロッコリー	花蕾腐敗病						
てんさい	褐斑病						
あずき	褐斑細菌病						
いんげんまめ	かさ枯病						
だいず	斑点細菌病						
いちご	炭疽病 角斑細菌病						
にんじん	黒葉枯病	500～ 1000 倍	100～ 300L/10a	—	—	—	—
たまねぎ	りん片腐敗病	1000 倍					
	軟腐病	1000～ 2000 倍					
野菜類	軟腐病 黒腐病 斑点細菌病 褐斑細菌病	2000 倍			—	散布	—
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病						
にんにく	春腐病						
やまのいも	葉渋病						
しよくよう ほおずき	斑点細菌病						
くわい	ひぶくれ病						
かぼちゃ	果実斑点細菌病						
茶	赤焼病 もち病 炭疽病 網もち病 褐色円星病 新梢枯死症 (輪斑病菌による)						
びわ びわ(葉)	がんしゅ病	200～ 700L/10a	—				
いちじく	疫病						

(つづき)

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	銅を 含む 農薬 の総 使用 回数	
かんきつ	かいよう病	1000 倍	200～ 700L/10a	発芽前 生育期	—	散布	—	
	黒点病 褐色腐敗病	2000 倍		—				
ぶどう	べと病 さび病			—				
おうとう	褐色せん孔病			収穫後				
りんご	斑点落葉病 すす点病 すす斑病 輪紋病 褐斑病			—				
ホップ	べと病			2000 倍				葉芽発芽 前まで
うめ	かいよう病			1000 倍				収穫後 ～果実 肥大期
	花腐細菌病							休眠期～ 叢生期 (新梢長 約 10cm)
もも ネクタリン	せん孔細菌病			1000 倍				収穫後か ら 落葉まで
								開花前 まで
パパイヤ	軟腐病	1000 倍	—					

[コサイド®3000 の製品ページに戻る](#)