

適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チヤシルを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	シヤカトモシトセンチュウ	30kg/10a	植付前	1回	全面土壌混和	1回
	ネグサレセンチュウ	20kg/10a			植溝処理 土壌混和	
なす	アブラムシ類		1.5～2.5g/株		育苗期	株元処理
	シメキイロサシマ	1～2.5g/株				
ピーマン	アブラムシ類	1.5～2.5g/株	定植前		全面土壌混和	
	ネコブセンチュウ	50kg/10a				
メロン(地床)	シメキイロサシマ	1～2.5g/株	育苗期		株元処理	1回以内 (育苗期の株元処理は1回以内、定植前の土壌混和は1回以内)
メロン(揚床)		1g/株				
メロン	ネコブセンチュウ	40～50kg/10a	定植前		全面土壌混和	
きゅうり	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	25～50kg/10a	は種前又は定植前		全面土壌混和	
	アブラムシ類		定植前	株元処理		
	シメキイロサシマ	1～2.5g/株	育苗期			
すいか	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	25～35kg/10a	は種前又は定植前	全面土壌混和	1回	
	シメキイロサシマ	1～2.5g/株	育苗期	株元処理		
	アブラムシ類	1.5～2.5g/株				
とうがん	シメキイロサシマ	2.5g/株	定植時	植穴処理	1回	
にがうり	ネコブセンチュウ	40kg/10a	定植前	全面土壌混和		
レタス	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	40～50kg/10a				
リーフレタス		40kg/10a	定植前 但し、収穫75日前まで			
トマト ミニトマト		25～50kg/10a	定植前			
だいこん	ネコブセンチュウ アブラムシ類	20～50kg/10a	は種前			
	ネグサレセンチュウ					
にんにく	ネグサレセンチュウ	30～50kg/10a	植付前			全面土壌混和
にんじん	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	20～50kg/10a	は種前			
ごぼう		20～37kg/10a				
もりあざみ	キタネグサレセンチュウ	40～50kg/10a	植付前 (挿苗前)		全面土壌混和	
かんしょ	ネコブセンチュウ	30～40kg/10a		作条土壌混和		
やまのいも	ネグサレセンチュウ	40～50kg/10a	植付前	全面土壌混和		
さといも		40kg/10a				

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキサミルを含む農薬の総使用回数
あずき だいず	ダイズシストセンチュウ	6kg/10a	は種前	1回	作条土壌混和	1回
		30kg/10a			全面土壌混和	
6kg/10a		は種前又は 定植前	作条土壌混和			
30kg/10a			全面土壌混和			
たばこ	ネコブセンチュウ ネコサレセンチュウ	37kg/10a	定植前		作条土壌混和	

[バイデータL粒剤の製品ページに戻る](#)