

今日もあなたのそばに。明日もあなたのために。



The miracles of science™

# デュポン通信

2009.5  
Vol.3

## 定植直後のはじめの1本

# トルネード®フロアブル



定植直後のキャベツやはくさいの苗にシンクイムシが入り込んでしまい、せっかく植えた苗が台無しになってしまった経験はありませんか？

シンクイ、とよく呼ばれるこの害虫はダイコンシンクイムシ。ハイマダラノメイガとも呼ばれ、作物の生長点を好んで食害するので幼苗期の被害による作物へのダメージは非常に深刻です。

このシンクイムシに効果のある殺虫剤はいくつかありますが、苗が小さく非常にデリケートな定植直後の時期は、農薬散布による薬害がとて出やすいので、慎重に薬剤を選ぶ必要があります。



ダイコンシンクイムシ (ハイマダラノメイガ)



トルネード®フロアブルが持つ最大の特長は、作物への高い安全性、つまり薬害が出るリスクが非常に低いという点です。

トルネード®フロアブルによる作物への薬害が、これまでに確認された事例はなく、小さな苗にも安心してお使いいただけます。もちろん、害虫に対しては高い殺虫効果を発揮しますので、食害、薬害のないきれいな作物を育てることができます。

**定植直後に、幼苗に優しいトルネード®フロアブルを散布し、  
しっかり害虫防除をしておきましょう！**

®は米国デュポン社の登録商標です。

お問い合わせは、デュポン農業製品情報センターへお願いします。

**FAX** 03-3549-1819

**e-mail** [news@dupont-info.jp](mailto:news@dupont-info.jp)

※情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを発送しております。ご不要の場合はお手数ですがデュポン農業製品情報センターまでご一報ください。

デュポン株式会社 | 〒100-6111 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー